



Les **forêts riediennes** se singularisent par leur habitat très particulier constitué essentiellement par l'Aulnaie-Frênaie-Chênaie, qui dépendent également de la composition des sols des Rieds. Le **Clitocybe poivré** a permis par sa simple présence sur un site du Ried noir, de faire protéger toute une partie d'une forêt communale. C'est le but d'une espèce parapluie, elle fait office de propagande et de mascotte pour pouvoir aboutir à la protection d'un milieu. C'est l'unique station de ce champignon connue en Europe. Le **Rhodocybe trompeur** vient en petits groupes, mais toujours fidèle à ses rares stations ; quant à l'**Agaric de Bresadola**, précoce dès le mois de mai, il peut envahir des surfaces impressionnantes de ses sporophores certaines années, alors qu'il est particulièrement rare ailleurs.

L'élaboration d'une liste des espèces déterminantes ne peut se faire que sur des critères précis. Le contexte étant celui d'une protection des habitats, les espèces choisies doivent être inféodées à un habitat déterminé, indiquant le bon équilibre écologique de cet habitat. D'autres critères moins scientifiques mais typiquement pratiques sont aussi à considérer : la présence de ces espèces doit pouvoir être décelable par un usager averti (mycologue de préférence), donc être relativement repérables sur le terrain et identifiables sans étude approfondie ni littérature spécialisée.

LES ESPECES PARAPLUIES ont été choisies parmi les espèces les plus visibles ou les plus remarquables, inféodées à un type de milieu et représentatives des espèces plus discrètes (et parfois d'intérêt patrimonial supérieur) partageant le même habitat.

Les champignons déterminants *Forêts riediennes*



Mycena rhenana

Cette remarquable espèce est caractéristique des milieux rhénans alluviaux. Elle se développe sur les cônes d'aulnes glutineux, voire sur les pétioles des fruits ou des feuilles. Non menacée actuellement et classée en préoccupation mineure dans la liste rouge alsacienne.

*Des champignons phares et emblématiques,
pour la protection de leurs habitats.*

En collaboration avec :



© Textes et photos LAURENT P.

Nos partenaires :

Dans le cadre du Service d'Information Naturaliste mis en place par le CSA



ESPECE PARAPLUIE

Espèce à valeur écologique forte et déterminabilité élevée.

- Espèce caractéristique d'une mycocoenose rare ou vulnérable
- Espèce inféodée à un milieu rare ou vulnérable



Gerhardtia piperata (A. H. Smith) M. Bon

Clitocybe poivré

Chapeau 6 à 8 cm, convexe à plat, marge un peu enroulée, finement striée à l'extrême bord sur 1 à 2 mm, revêtement glabre, mat, couleur crème sale, mastic à ochracé clair. **Lames** assez espacées, nettement plus serrées au bord (présence de nombreuses lamelles), adnées à subdécurrentes, peu larges. **Stipe** 5 à 6 cm, épais de 1 cm ou un peu moins, cylindracé, légèrement clavé à aminci à la base, de la couleur du chapeau, lisse, à sommet un peu pruneux, médullé-farci, à « moelle » blanche. **Chair** blanche, à odeur de fût de vin à la cueillette, puis fongique et légèrement fétide ensuite. Saveur piquante supportable, goût désagréable.

Société Mycologique des Hautes Vosges (SMHV) / Station d'Etudes Mycologiques des Hautes Vosges (SEMHV) - 26 route du Repas - 88520 WISEMBACH 03.29.57.39.13. - <http://www.smhv.net>

Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) - Maison des Espaces Naturels - Ecomusée - 68190 UNGERSHEIM - 03.89.83.34.20. - <http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu>

ESPECE DETERMINANTE

Espèce à valeur écologique forte/moyenne et déterminabilité élevée à moyenne.

- Espèce caractéristique d'une mycocoenose riche en espèces ou espèce compagne d'une mycocoenose rare
- Espèce préférentielle d'un milieu rare ou vulnérable



Rhodocybe fallax (Quélet) Singer

Rhodocybe trompeur

Chapeau 2-3 (4) cm, convexe puis plan, plus ou moins déprimé avec un mamelon, marge onduleuse enroulée, mat à finement tomenteux puis plus ou moins craquelé, blanc, blanc sale. **Lames** serrées, larges, décurrentes, minces et étroites, blanches puis crème teinté de rose saumon très clair. **Stipe** fibrilleux, pruneux, plus ou moins courbé à la base, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanc. **Chair** mince mais peu fragile et au contraire un peu élastique, blanche, saveur farineuse et amère, odeur fruitée-farineuse faible.

ESPECE CARACTERISTIQUE

Espèce à valeur écologique médiocre mais liée à des conditions déterminées et caractéristiques d'associations d'espèces plus rares.

La présence de cette espèce sur un site doit inciter à y rechercher plus spécifiquement l'espèce déterminante ou parapluie associée au même habitat.



Agaricus bresadolanus Bohus

Agaric de Bresadola

Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins étalé, marge parfois appendiculée, couvert de squames nettes au centre, plus rares vers la marge, brunâtres, gris roussâtre, fuligineux terne, sur fond blanchâtre. **Lames** roses puis brun pourpre, arêtes entières fertiles. **Stipe** renflé à subbulbeux avec des rhizoïdes en cordonnets, anneau mince en jupette, 5-10 x 1-2,5 cm, blanchâtre jaunissant un peu à la base. **Chair** blanche, parfois un peu rosissante, jaunissante vers la base du stipe.