

Déclinaison régionale du Plan national d'actions en faveur des papillons de jour


L'Azuré des paluds

L'Azuré des paluds (*Phengaris nausithous*) est à rechercher dans les prairies permettant le développement de sa plante hôte et de sa fourmis hôte.

Habitat : prairies humides et/ou inondables

Plante hôte : *Sanguisorba officinalis*

Fourmis hôte : *Myrmica rubra*



Période de vol : mi-juillet à début septembre


Pic de vol : entre le 26 juillet et le 1er aout

L'observation du dessous de l'aile est obligatoire pour son identification : pensez à la photo !



Dessous des ailes : brun chocolat à brun cannelle avec une seule rangée de points noirs


Dessus



♂

♀

Une seule rangée de points



Dessous

Illustration : L. Dietrich d'après TOLMANN T. & LEWINGTON R. (1999).



Dessous des ailes



Accouplement



Dessus d'un mâle

Déclinaison régionale du Plan national d'actions en faveur des papillons de jour

L'Azuré de la sanguisorbe

L'Azuré de la sanguisorbe (*Phengaris teleius*) est à rechercher dans les prairies permettant le développement de sa plante hôte et de sa fourmis hôte.

Habitat : prairies humides et/ou inondables

Plante hôte : *Sanguisorba officinalis*

Fourmis hôte : *Myrmica scabrinodis*



Période de vol : fin juin à début septembre

Pic de vol : entre le 20 et le 27 juillet

L'observation du dessous de l'aile est obligatoire pour son identification : pensez à la photo !



Dessous des ailes : beige à gris avec deux rangées de points noirs et une légère suffusion bleue





Illustration : L. Dietrich d'après TOLMANN T. & LEWINGTON R. (1999).



Dessous des ailes



Accouplement



Dessus d'un mâle



Dessus d'une femelle